

Comentário

Doença de Crohn e tumor carcinóide gástrico

Crohn's disease and gastric carcinoid tumor

Erlene Roberta Ribeiro dos Santos 

Centro Acadêmico de Vitória, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Brasil.



erleneneurociencia@gmail.com

Uma excelente revisão sobre doença de Crohn associada com tumores carcinóides gástricos pode ser lido no artigo publicado pela Dra. Cristiane Tiburtino de Oliveira Gomes e colegas.¹ Esses tumores carcinóides gástricos são neoplasias consideradas raras; de origem das células enterocromafins, que podem se associar com a doença de Crohn, uma afecção inflamatória intestinal.

Os autores lembram que para o diagnóstico exames mais específicos são baseados na cintilografia, com utilização de isótopos ligados ao derivado da somatostatina, alcançando acurácia superior a 80%.¹ Além disso, nos exames anatomopatológicos inconclusivos, marcadores imunohistoquímicos (e.g., cromogranina A e a sinaptofisina) podem ajudar na definição do diagnóstico.¹ Assim, uma atenção especial deve ser prestada aos tumores carcinóides em pacientes com doença de Crohn.

Referência

1. Gomes CTO, Luz PFN, Costa GDF, et al. Doença de Crohn associada a tumor carcinóide gástrico: Relato de Caso e Revisão de Literatura. *GED gastroenterol endosc dig* 2016;35:162-165